

## DENTS DE SAGESSE : Est-il sage de les conserver ou de les extraire ?

---

[mabouchemasante.fr/fiche\\_buccodentaire/dents-de-sagesse-est-il-sage-de-les-conserver-ou-de-les-extraire/](https://mabouchemasante.fr/fiche_buccodentaire/dents-de-sagesse-est-il-sage-de-les-conserver-ou-de-les-extraire/)

### À savoir

---

Les dents de sagesse correspondent aux dernières dents faisant leur éruption tout à fait en arrière des arcades dentaires.

Ce sont les troisièmes molaires.

### Pour aller plus loin

---

Les troisièmes molaires sont au nombre de 4 et font leur éruption entre 18 et 25 ans en arrière des molaires précédemment en place. Dernières arrivées, elles n'ont pas toujours suffisamment de place pour sortir ou se positionner correctement. Il arrive que ces dents soient totalement absentes, on parle alors d'agénésie. Si elles sortent partiellement on parle de dents semi-incluses, lorsqu'elles sont totalement retenues dans l'os on parle de dents incluses.

Leur progression se fait par à-coup avec des phases de repos et des phases d'activité. Lors des poussées, des douleurs peuvent apparaître.

Il est important de surveiller leur évolution. L'extraction des dents de sagesse n'est pas obligatoire. Si elles sont placées correctement sur l'arcade ou incluses mais asymptomatiques, il conviendra de les conserver. Par contre si elles sont gênantes, cariées, symptomatiques (douleurs récurrentes, inflammation gingivale, entraînant une pression sur les autres dents) leur retrait est indiqué.



### À retenir

---

Il est important de consulter votre dentiste régulièrement afin qu'il ou elle puisse suivre la progression de vos dents de sagesse.

L'extraction n'est pas systématique. Chaque patient est unique.

**Les dents de sagesse ont besoin d'être retirées en présence de symptômes tels que la douleur, une infection, un kyste, des dommages aux dents adjacentes, une gingivite, une carie dentaire avec impossibilité de restauration ou après un traitement orthodontique....**